Notre forêt communale...

Si les peuplements forestiers ont peu d'intérêt sylvicole, il en va différemment de leur intérêt environnemental

Selon une nomenclature internationale spécifique, dite Corine Biotope, notre forêt présente cinq "habitats naturels" dont quatre sont d'intérêt communautaire. Les états membres de la Communauté Européenne ont une obligation légale de préservation de ces habitats remarquables à l'échelle de l'Europe.

Habitats	Nomenclature CORINE Biotope	
9130 - Hêtraies de l'Asperulofagetum	4113	Habitat d'intérêt communautaire
9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Céphalantéro- Fagion	4116	Habitat d'intérêt communautaire
Chênaies thermophiles à quercus pubescens	4171	
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire	3122 3133 3432	Habitat d'intérêt communautaire
8210 - Falaises calcaires	62-1	Habitat d'intérêt communautaire

La forêt est totalement située dans la **ZNIEFF** (zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique) de type II numéro 0002 « Côte et Arrière-Côte de Dijon » et en **ZICO** (zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux) be04 « Arrière-Côte de Dijon et de Beaune ».

Le périmètre de protection éloignée du captage de la source de Morcueil englobe les parcelles 1 à 6 et 15 à 19.

Une espèce végétale protégée est présente dans la forêt ; **l'Inule des montagnes** (*Inula Montana*). Elle se rencontre dans certaines pelouses situées sur des corniches calcaires en haut de falaises, présentant un intérêt écologique tout à fait particulier (dans des parties des parcelles 9,10 et 11).

"La pelouse calcaire sèche" occupe deux sites : l'une dans les parcelles 9 et 10 est très sèche et stable (xérobromion) tandis que l'autre en parcelle 11 l'est beaucoup moins (mésobromion) et se refermera donc (par embroussaillage) plus vite. Sur la corniche on trouve aussi la chênaie pubescente, habitat naturel, ici en limite Nord de son aire naturelle, plutôt méditerranéenne.

Dans les parcelles 1, 3 et 15 on rencontre des **lapiaz** recouvertes en partie par du buis. La roche calcaire est presque à nu et entaillée de ciselles ou crevasses plus ou moins profondes dues à des phénomènes géologiques de ruissellement.

Le Cerf élaphe, le Sanglier, le Chevreuil, le Renard et le Blaireau sont les mammifères les plus fréquents dans le massif. L'état sanitaire des cervidés est bon, mais leur densité est à la limite de rupture de l'équilibre forêt-gibier dit sylvo-cynégétique (gros dégâts d'abrutissement, de frottis et d'écorçage dans les régénérations et sur les jeunes plants).

Les besoins économiques et sociaux

-La forêt produit très peu de bois d'œuvre et il n'y a pas eu de vente de grumes récemment, hormis une exploitation de pins noirs, cette année au Chaillot. Le marquage de quelques réserves lors des dernières coupes de Taillis-Sous-Futaie (TSF) n'a pas trouvé preneur à cause d'une qualité médiocre, du très faible volume proposé et des difficultés d'exploitation et d'accès. Dans le passé, la commune a occasionnellement vendu des bottes de buis.

La commune pratique l'affouage. Le volume délivré annuellement est de l'ordre de 90 m³ pour une dizaine d'affouagistes. Leur nombre évolue avec le prix du fuel.

-**La chasse** se pratique à tir et en battue. Les gibiers recherchés sont le Sanglier, le Cerf élaphe et le Chevreuil. Deux sociétés locales de chasse sont présentes sur la forêt communale et ont chacune un canton de forêt. Elles disposent en plus de terrains privés sur Fleurey et sur les communes limitrophes. Les plans de chasse qui leur sont attribués concernent l'ensemble de leur territoire, mais sont représentatifs des populations de gibier présentes localement.

Lot n° 1 : 98 ha de bois communaux (parcelles 1 à 8 et 15 à 19) plus autres territoires (584 ha en tout) : 1 cerf C1, 2 biches, 1 jeune cervidé, 42 sangliers et 15 chevreuils.

Lot n° 2 : 54 ha de bois communaux (parcelles 9 à 14), 60 ha de friches boisées communales attenantes plus autres territoires (371 ha en tout) : 1 cerf C1, 1 cerf C2, 4 biches, 4 jeunes cervidés, 20 sangliers et 30 chevreuils.

Le Cerf C1 porte au maximum 10 cors (ou pointes) et le C2 porte au minimum 10 cors.

- **Des randonneurs** et chercheurs de champignons se promènent occasionnellement. La sensibilité paysagère est importante sur une partie de la forêt, visible depuis le village et l'autoroute. Les parties de forêt concernées sont surtout les pentes exposées au Nord.

Une carte des paysages remarquables et des sensibilités paysagères permet de situer les secteurs justifiant des précautions de gestion (coupes...).